

ЭТИОЛОГИЯ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Дементьева Е. А., Швец М. В., Сулименко А. Д., Гаврищук М. Д.

На сегодняшний день заболевания височно-нижнечелюстного сустава встречаются достаточно часто и их своевременная диагностика, а также комплексное лечение являются актуальными. По некоторым литературным данным частота встречаемости мышечно-суставной дисфункции составляет 60% населения в возрасте от 18 до 55 лет. Этиологическим фактором патологии височно-нижнечелюстного сустава являются зубочелюстные аномалии, частичное отсутствие зубов, осложненное дистальным смещением нижней челюсти. Мнения современных авторов, изучающих этиологию дисфункций ВНЧС, значительно разнятся, и ведущая роль в развитии данного заболевания отдается той или иной группе факторов.

Ключевые слова: обзор литературы, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, окклюзионные нарушения.

To date, diseases of the temporomandibular joint are quite common and their timely diagnosis, as well as complex treatment, are relevant. According to some literature data, the incidence of musculo-articular dysfunction is 60% of the population aged 18 to 55 years. The etiological factor in the pathology of the temporomandibular joint is dental anomalies, partial absence of teeth, complicated by distal displacement of the lower jaw. According to modern authors studying the etiology of TMJ dysfunctions, they differ significantly and the leading role in the development of this disease is given to one or another group of factors.

Keywords: literature review, temporomandibular joint dysfunction, occlusal disorders

Цель исследования: выявить основные этиологические факторы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

Задачи исследования:

1. Провести анализ современной литературы по данной проблеме.
2. Провести ретроспективный анализ амбулаторных карт стоматологических пациентов Краевой стоматологической поликлиники г. Барнаула.
3. Сопоставить данные литературы с данными анализа амбулаторных карт.
4. Выявить основные факторы риска заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.

Материалы и методы исследования. Работа с современной научной литературой, анализ последних научных исследований в развитии дисфункции ВНЧС, анализ амбулаторных карт пациентов.

Результаты исследования. По результатам исследования нами были определены следующие основные этиологические факторы развития дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: аномалии окклюзии (68%), у 13% пациентов данные проявления обусловлены некачественным протезированием, 11% случаев связаны с частичным отсутствием зубов, 8% составляют мышечные нарушения, травматический фактор. Таким образом, можно сделать вывод, что большинство авторов выделяют мультифакторную концепцию развития дисфункции ВНЧС, основанную на нестабильности жевательного аппарата, прежде всего из-за нарушений окклюзионных взаимоотношений, мышечной патологии и т.д.

Список литературы:

1. Кирсанов С.И. Современные представления об этиологии заболеваний височно - нижнечелюстного сустава: обзор литературы. 2019. В сборнике: новая наука: история становления, современное состояние, перспективы развития. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа, 2021. С. 148-152.

2. Жулев Е.Н., Вельмакина И.В., Тюрина К.С. Влияние уровня психоэмоционального напряжения на клинические проявления мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава у лиц молодого возраста. Современные проблемы науки и образования. 2018. № 1. С. 52.

3. Бекреев Валерий Валентинович. Диссертация. Диагностика и комплексное лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. 2018.

Как цитировать:

Дементьева Е.А., Швец М.В., Сулименко А.Д., Гаврищук М.Д. Этиология дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Материалы V конференции с международным участием «По итогам НИР: наука и практика в стоматологии». Барнаул. *Scientist*. 2023; 3 (25): 172-174.
