

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОХВАТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРИВИВКАМИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ

*Алтайский государственный медицинский университет,
кафедра эпидемиологии, микробиологии и вирусологии, г. Барнаул*

Дук Надежда Александровна

E-mail: k-epidem@asmu.ru

Научный руководитель: Лукьяненко Н.В., д.м.н., профессор, профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и вирусологии, SPIN-код: 1140-9650.

Ключевые слова: вакцинация новорожденных, профилактические прививки.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет иммунизацию населения как стратегически важный и экономически обоснованный шаг в системе общественного здоровья и здравоохранения, подчеркивая ее ключевую роль в существенном снижении детской смертности и повышении состояния здоровья матерей, согласно принятому Глобальному плану вакцинации [1, 3].

Цель: оценить объем охвата профилактическими прививками новорожденных в раннем неонатальном периоде с учетом исходного состояния матерей. Выяснить приверженность современных женщин к вакцинации их новорожденных в условиях родильного дома.

Материал и методы

Проведен клинико-статистический анализ результатов вакцинации новорожденных против вирусного гепатита В и туберкулеза в Перинатальном центре краевого государственного учреждения

здравоохранения «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» за 2024 год. В качестве материалов для исследования использовались истории развития новорожденных, истории родов, карты анонимного анкетирования. В ходе эпидемиологического аналитического исследования по типу «случай – контроль» оценивались: вес и гестационный возраст новорожденного, сопутствующие заболевания родильницы на момент родов и т.п. В результате оценки сформированы 3 группы новорожденных: 1 группа – новорожденные от матерей с гестационным сахарным диабетом (ГСД), $n=115$; 2 группа – новорожденные от матерей с фетоплацентарной недостаточностью (ФПН), $n=213$; 3 группа (контрольная) – здоровые новорожденные, $n=221$. Всего проанализировано 549 историй болезни новорожденных за 2024 год, 81 анкета.

Результаты

В группе здоровых новорожденных прививками против вирусного гепатита В было охвачено 97% детей ($n=214$), 3% ($n=6$) являются отказами матерей от вакцинации. В группе новорожденных от матерей с гестационным сахарным диабетом привитых было 90% ($n=104$), отказов – 10% ($n=11$). Среди новорожденных от матерей с фетоплацентарной недостаточностью привито 74,3% ($n=158$), отказов – 10,3% ($n=22$), медицинские отводы – 15,4% ($n=33$). Лидирующей причиной медицинских отводов являлся перевод новорожденного в отделение реанимации в первые сутки жизни.

Охват здоровых новорожденных прививками против туберкулеза составил 92% ($n=203$), 8% ($n=18$) – отказы, медицинских противопоказаний к вакцинации не было. Охват новорожденных от матерей с гестационным сахарным диабетом – 87% ($n=100$), медицинские отводы – 3,4% ($n=4$), отказ – 9,6% ($n=11$). Среди новорожденных от матерей с фетоплацентарной недостаточностью привито 32,9% ($n=70$), медицинские отводы составили 67,1% ($n=143$). Основными причинами медицинских отводов были врожденные пороки сердца, врожденные анемии и гипербилирубинемии, перинатальные поражения ЦНС, внутриутробные инфекции.

По результатам анкетирования было установлено, что из 81 женщины 76,5% (n=62) считали вакцинацию эффективной мерой профилактики инфекционных болезней, 18,4% (n=15) затруднялись с ответом, 5,1% (n=4) женщин не считали вакцинацию эффективной мерой профилактики инфекционных болезней.

Заключение

По результатам анкетирования выявлена необходимость персональной работы с родителями по их информированию о необходимости вакцинации детей против вирусного гепатита В и туберкулеза еще на этапе женских консультаций. Недостаточная санитарно-просветительная работа по вопросам вакцинации детей является причиной низкого уровня осведомленности населения и влечет за собой отказы родителей от своевременной и эффективной вакцинации.

Список литературы:

1. Приказ МЗ РФ от 21.03.2003г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации».
2. Башмакова Н.В., Голубкова А.А., Кузнецова О.А. К вопросу полноты и своевременности вакцинации новорожденных в условиях перинатального центра. *Инфекция и иммунитет*. 2017; S: 243.
3. Информационное письмо ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» от 07.08.2024г. № 01-21/1103.

Поступила в редакцию 03.02.2025
Принята к публикации 18.02.2025
Опубликована 31.03.2025

Как цитировать:

Дук Н. А. Современные тенденции охвата профилактическими прививками в многопрофильном стационаре третьего уровня. *Scientist (Russia)*. 2025; 1 (31): 84-86.
